

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十五

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱忻

謄錄監生臣伍士鵬

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十五 明

周王朱橚 撰

產後諸疾門

咳嗽 附論

夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後吃鹽太早而咳嗽者難治○產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麵壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣

急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛
肢體無力宜服局方真黑神散五積散如棗煎服○內
經謂五氣所病在氣為咳嗽產後臟腑俱弱風寒來虛
而客於肺肺為華蓋位處於上其俞皆在外合皮毛寒
氣客之則先乘於肺肺感之故為咳嗽○肺感微寒則
成咳嗽而肺主氣因產後氣虛風冷寒於肺故咳嗽也

方

桃仁散 治產後咳嗽有時寒熱四肢乏力疼痛不思

飲食

桃仁

湯浸去皮尖
雙仁麩炒

桑白皮

各三分

當歸

炒

白茯苓

白朮

人參

甘草

各三分

鱉甲

塗醋炙
去裙襴

紫苑

洗去
苗土

木香

桂心

白芍藥

子芩

陳皮

湯浸
去白

熟

地黃

各半兩

柴胡

一兩
去苗

右為散每服四錢水一鍾生姜半分棗三枚煎六分

去滓溫服

紫苑散

治產後咳嗽四肢無力喫食減少

紫苑

半兩洗
去土

人參

三分
去蘆

半夏

半兩湯洗
七遍去滑

白茯苓

陳皮

三分湯
洗去白

麥門冬

一兩
去心

當歸

黃耆
一兩

白芍

藥

半兩

桂心

半兩

熟地黄

一兩

甘草

一分

五味子

三分

杏仁

半兩

湯浸去皮尖

雙仁麩炒

右為末每服四錢水一盞生姜半分棗三枚煎六分

去滓不計時溫服

天門冬散 治產後咳嗽心膈不利涕唾稠粘四肢煩

熱不思飲食

天門冬去心焙 前胡去蘆 赤茯苓 黃耆 杏仁湯洗

去皮尖雙仁不用 桑白皮各三分 生地黃 當歸微炒 百合

款冬花 赤芍藥 甘草各半兩

右為散每服四錢水一盞生薑半分煎六分去滓不

時溫服

熟乾地黄散 治產後虛羸四肢無力喫食減少常多

咳嗽

熟地黄 桂心 細辛 杏仁去皮尖雙仁麩炒各半兩

五味子 人參 白朮 白茯苓 百合 當歸

各三分
甘草 一分 陳皮 湯浸 三分

右為散每服四錢水一中盞姜半分棗三枚煎六分

去滓不計時溫服

人參散 治產後虛乏短氣咳嗽不思飲食

人參 續斷 白茯苓 黃耆 熟地黄 白朮

白微 五味子 當歸 芎藭 各半兩 麥門冬 去心 一兩

甘草 一分

炙

右為散每服四錢水一中盞生姜半分棗三枚煎六分去滓不計時候

欬冬花散 治產後咳嗽涕唾稠粘胃膈壅悶喘急不調四肢無力

欬冬花

貝母

煨

桔梗

紫苑

去苗土

旋覆花

五

味子

海蛤

天門冬

去心

赤茯苓

漢防己

一分

甘草

各半兩

右為散每服四錢水一中盞生姜半分棗三枚煎六

分去滓不時溫服

百部丸 治產後咳嗽連聲不絕痰涎壅盛

百部

焙半兩

細辛

去苗葉三兩

貝母

甘草

紫苑

桂

各二兩

白朮

麻黃

五味子

各三兩

杏仁

去皮尖雙仁麩炒四

兩

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食前臨臥服

犀角散 治產後咳嗽吐血不止心中煩悶頭目旋悶

犀角屑

分三麥門冬

去心一兩半

赤茯苓

一兩 鷄蘇

一生地

黃

一兩 馬兜鈴

分三紫苑

三分洗去土

甘草

半兩 羚羊角屑

分三

竹茹

一分

右為散每服四錢水一中盞生姜半分煎六分去滓

不計時服

人參散 治產後腹冷肺寒咳嗽鼻多清涕不欲飲食

四肢無力

人參

白朮

陳皮

厚朴

薑汁製

乾薑

白茯苓

各三分 紫苑

洗去土苗

桂心

細辛

甘草

炙各半兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

不計時服

療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母

各六分

桑白皮

茯苓

苓 各淡竹葉

三十片

右㕮咀水二升煎取八合去滓食後分二服

百部湯

治產後咳嗽痰壅煩悶

百部 欵冬花 紫苑去苗土 貝母 知母 白微

杏仁

去皮尖
雙仁炒

右等分為散每服三錢約以水一盞煎七分去滓不
拘時溫服

二母散 治惡露上攻入肺經咳嗽如傷風痰嗽服尋
常傷風藥不效宜服

知母 貝母 白茯苓 人參各半兩 桃仁 杏

仁

去皮尖
各一分

右為末每服三錢水一盞半煎八分無時溫服如覺
腹痛併服

紫苑湯 治產後咳嗽痰涎壅悶

紫苑

去苗土

貝母

去心一兩

人參

一兩

白茯苓

二兩

陳皮

半兩

杏

仁

去皮尖雙仁炒一兩半

右為散每服三錢煎七分去滓溫服不拘時

療產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗

各六分

桑白皮

二十分

百合

赤茯苓

各八分

右呖咀水二升煮取七合去滓食後分三服

皂莢丸 治產後痰盛咳嗽頭目不利

皂莢

七挺不蛀者水浸絞取汁聽去皮

丁香

桂

各半兩

訶黎勒

去皮

十枚杏仁

八十枚去皮尖雙仁炒

右將四味搗為細末以皂莢水就銀石鉢內煎如膏
即將藥和搜為丸如梧桐子大每服十九烏梅湯下
不拘時

半夏湯 治產後咳嗽痰壅

半夏

半兩生薑汁
浸一宿切焙

貝母

去心
一兩

柴胡

一兩
去苗

甘草

猪

牙皂角

各半兩
去皮

右為散每服二錢淨水一盞生薑五片煎七分去滓

不計時服

黃耆湯 治產後肺氣虛寒咳嗽喘悶

黃耆

桔梗

人參

各半
兩

白茯苓

半
兩

山芋

半
兩

右搗篩每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

柴胡湯 治產後咳嗽喘急煩悶

柴胡

麻黃

去根節煎
掠去沫焙

紫蘇莖葉

陳皮

杏仁

去皮尖

雙仁炒

右等分麤搗篩每服三錢煎七分去滓不時服

茱萸湯 治產後肺寒感咳嗽不已

吳茱萸

湯浸焙
三分

桂

一兩
兩細辛

一分

當歸

三分

杏仁

去皮
尖雙

仁炒

半兩

右搗篩每服三錢淨水一盞煎七分去滓不拘時服

百花散 治婦人產中咳嗽

黃蘗

桑白皮

用蜜塗慢火炙黃為度

糯米

二十粒

款冬花

燒灰

六錢

右為細末每服一二錢水一盞入糯米同煎至六分以款冬花攪在藥內同調溫服之

白散子 治產後瘀血結滯發為寒熱心胃如火煩躁口乾諸藥不效

大川烏

去皮
臍

南星

半夏

白附子

各一
兩

羌活

黃芩

各五
錢

右生用剉散每服三錢生薑五片水一鍾半煎服

旋覆湯

治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎壅塞

坐卧不寧

前胡

麻黃

杏仁

去皮尖
雙仁炒

五味子

淨

茯苓

甘

草

赤芍藥

荊芥

旋覆花

半夏

麴

右等分為麤末每服四大錢水一盞半薑五片棗三

枚煎七分食前服一感冒寒熱頭痛不宜服峻劑

神仙百解散 生料五積散 集驗療產後感風傷寒

咳嗽多痰唾粘

甘草 苦梗

各六分

款冬花

四分

麥門冬

生地黃

各十

二分葱白

握一豉

二合舊方無葱白與豉

右以咀水二升煮取八合去滓食後分二服

治產後嗽逆三日不止欲死

桂心

半兩

薑汁

三合

右同煎取二合以火先炙手摩令皆熱時塗藥汁盡
妙

治產後咳嗽

燒車釭頭脂內酒中分溫三服

咳嗽附論

夫肺主於氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血俱傷臟
腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中
伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不順則咳嗽

也脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮為氣厥逆則致生斯病也經云咳噫者胃寒所生服藥無効者灸期門三壯必愈期門穴乃胃之大路

方

丁香散 治產後心煩咳噫不止脾胃虛寒衛氣厥逆

丁香 白豆蔻仁

各半兩

伏龍肝

一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里

再服

石蓮散 治氣咳噫吐逆心怔目暈不思飲食

石蓮肉

炒半兩

白茯苓

一兩

丁香

半兩

右為細末每服三錢米飲調下無時候

羌活散 靈苑治咳嗽

羌活

附子

炮

茴香

炒各半兩

木香

白薑

炮各一分

右為麤末每服二錢淨水一盞鹽一捻煎一二十沸

熱服一服止

丁香散 治產後欬逆

石蓮肉

十箇去心焙

白茯苓

一兩丁香十枚

右為末水半盞煎數沸服

產後欬逆或患氣亂心煩

用乾柿一箇切碎以水一觔煎至六分熱呷

又方

治產後欬逆經三五日不止欲死

用古壁鏡窠三四箇以水一小觔煎至一半熱服

治婦人乾逆

用白芍藥為末姜五片煎服

治婦人產後逆氣

用青橘皮為末以葱白童子小便煎湯調服之

治產後逆不止

狗膽一箇 硃砂

丁香

五靈脂

各等分

右為細末以狗膽丸如白大豆大每服一九生薑水

磨下

霍亂附論

夫產後霍亂氣血俱傷五臟六腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散散寒多不飲水者理中丸大段虛冷者加附子來復丹亦妙 霍亂者由三焦氣不調清濁邪正相擾之間吐痢不已心痛者吐腹痛者痢痢不已則轉筋四肢厥逆

方

乾薑湯

治產後霍亂吐痢四肢逆冷虛煩

乾薑

炮三兩

黃連

去鬚三兩

赤石脂

三兩

當歸

三兩

半夏

研為末生

姜汁作餅
子五兩

赤茯苓

一兩

甘草

炙

桂

龍骨

紅

火燒

枳殼

去穢
麩炒

人參

附子

炮去皮臍
各二兩

右剉如麻豆每服五錢淨水一盞半生薑五片煎八

分去滓食前溫服

厚朴湯

治產後霍亂吐痢四肢逆冷虛煩

厚朴

去粗皮
姜製

高良薑

人參

白朮

各二兩

麥門冬

去心

赤茯苓

桂

甘草

各一兩半

紫蘇莖葉

全用
炮

陳皮

各一兩
一分

吳茱萸

一兩去
滑累炒

右搗篩每服三錢淨水一盞半生薑五片煎八分去

滓溫服食前

人參散

治產後霍亂吐痢胃虛煩躁

人參

白朮

當歸

麥門冬

去心

厚朴

薑製

草豆蔻

芎藭

白茯苓

訶黎勒皮

沉香

各三分

甘草

半兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時服

藿香散 治產後霍亂吐痢煩渴不已

藿香 香薷 白朮 麥門冬去心 厚朴薑製 葛根

人參各三分 桂心半兩 蘆根一兩 白豆蔻半兩 甘草一分

右為散每服三錢水一鍾生薑半分竹葉三七片棗三枚煎六分去滓不計時服

附子散 療產後霍亂吐痢不止手足逆冷腹痛煩渴

附子 白朮 當歸 吳茱萸 桂心 人參

丁香 橘紅 甘草

各半兩

右為細末粥飲調下二錢無時即理中丸加減虛冷甚者無來復丹

木香丸 治產後吐痢食物不化腹脇疼痛

木香

三兩炮

白豆蔻

十二枚炮去皮

草豆蔻

十二顆去皮

小蒜

切半

兩

菖蒲

炒一兩

神麴

炒一兩

乾椿根白皮

麥芽

各一兩半

阿魏

一錢別研入

右為末酒糊麵為丸如梧桐子大每服二十九煎橘皮湯下食前

白茯苓散 治產後霍亂吐瀉心神煩悶腹內疼痛四肢厥逆不時躁渴

白茯苓 三分 麥門冬 去心三分 草豆蔻 當歸 藿香

人參 高良薑 芎藭 甘草 各半兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓不計時服

香薷散 治產後霍亂吐痢煩渴心胃滿悶

香薷 前胡 麥門冬 人參 白朮 甘草炙

半夏浸湯七遍 陳皮湯浸去白皮 訶梨勒皮各半兩

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

不計時溫服

丁香散 治產後胃氣虛弱因飲食不節致成霍亂

丁香 肉豆蔻 當歸 白朮 縮砂去皮 人參

厚朴薑製 陳皮湯浸去白皮三分 甘草半兩炙剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

分去滓不計時服

厚朴散 治產後霍亂吐瀉不止

厚朴

去皮
汁製

陳皮

湯浸去
白穢

人參

各一兩

肉豆蔻

去
殼

紅豆蔻

桂心

白朮

乾薑

甘草

各半兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

不計時服

當歸散 治產後霍亂吐痢腹中疼痛

當歸 白芷 薤白 木香 白朮 高良薑 白芍

去皮

藥

各半兩

甘草

半兩

厚朴

一兩姜製

吳茱萸

一分浸七遍

右為末每服二錢粥飲調下不計時

厚朴湯 治產後霍亂吐痢肢體逆冷

厚朴

去皮薑汁製

陳皮

去白

當歸

桂

各二兩

甘草

人參

附子

炮製去皮臍各一兩

白朮

三兩

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服食前

藿香湯 治產後霍亂吐痢腹痛轉筋煩悶

一名木瓜散

藿香葉 當歸 人參 五味子 白朮 赤

各一兩

茯苓

黃耆

各一兩半

木瓜

二兩

右為散每服五錢淨水一錢半煎八分去滓溫服一

方用薑煎

溫中散 治產後霍亂不止吐瀉之疾

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾薑 厚

各一兩

朴

二兩

為細末每服三錢水煎服

白朮散 治產後霍亂吐痢腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘紅 麥門冬 人參 乾薑 甘草

半兩

右為細末每服四錢生薑五片水一盞煎七分去滓

溫服

白朮湯 治產後霍亂吐痢不思食

白朮 赤茯苓 人參 甘草 厚朴 枳

各一兩

一兩

薑汁製

殼 各一兩
半麴炒

右為散每服五錢淨水一盞半煎八分去滓不拘時

服

厚朴湯 治產後霍亂吐瀉

厚朴

薑汁製
一兩

陳皮

去白穰
半兩

藿香

去枝
梗

高良薑

當

歸各三
分

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

葛根湯 治產後霍亂吐痢煩渴不食

葛根 人參 白朮 桔梗 白茯苓

各半兩

右為散每服三錢淨水一盞半煎八分去滓溫服不

拘時

當歸湯 治產後霍亂吐痢心腹痛

當歸

二兩 乾薑

半兩 人參

厚朴

薑製 芎藭

各一兩半

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓空心服

枳殼湯 治產後霍亂吐痢厥逆不食

枳殼

去穢炒

甘草

各三分

胡椒

一分

人參

一兩

右為散每服五錢淨水一盞煎七分去滓不拘時服

厚朴湯 治產後霍亂吐痢

黃連

去鬚

甘草

炙各一兩

厚朴

薑汁製一兩半

肉豆蔻

去殼半兩

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓空心溫服

人參湯 治產後霍亂吐痢

人參 陳皮

去白切

乾薑

甘草

各一兩

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服日三

厚朴湯 治產後霍亂吐痢不止

厚朴

薑汁製

乾薑

當歸

甘草

各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服

高良薑散 治產後霍亂吐痢腹中疼痛

良薑 當歸 草豆蔻仁

右等分為細末每服二錢粥飲調下

胡椒湯 治產後霍亂吐痢不止腹痛

胡椒分一乾薑半訶梨勒皮一兩甘草三

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓空心溫服

木瓜湯 治產後霍亂吐痢腳轉筋

木瓜

去子
二兩

生薑

吳茱萸

黑豆炒
各一兩

右搗篩每服五錢淨水一盞半煎八分去滓溫日二

服

蘆根飲

治產後吐痢霍亂心腹痛

蘆根

二兩
人參

枇杷葉

各一兩

右搗篩每服五錢淨水一盞半煎八分去滓溫服不

拘時

嘔吐

附論

產後氣血尚虛風冷之氣傷於脾胃令飲食俱不能運
行則否而不通其氣上衝故令嘔逆久不已則中焦虛
而不食強食亦令人噎塞也○夫胃為水穀之海水穀
之精以為血氣榮運臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣
乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也

方

白豆蔻散 治產後脾胃氣寒嘔逆不納飲食四肢乏
力不能運動

白豆蔻

去皮

人參

去蘆頭

白朮

黃耆

當歸

附子

去皮

白茯苓

各三分

半夏

半兩湯浸七遍去滑

陳皮

一兩湯洗去白

甘

草一分 乾薑

芎藭

各半兩

右為散每服三錢水一中觔生薑半分棗三枚煎六

分去滓服

草豆蔻散

治產後脾胃虛寒或時嘔逆不下飲食

草豆蔻

去殼

陳皮

當歸

白朮

前胡

附子

去皮

臍

人參

去蘆

木香

桂心

半夏

湯浸七遍

甘草

炙各半兩

右為散每服四錢水一中觔生薑半分煎六分去滓
不計時候服

訶梨勒散 治產後脾胃傷冷嘔逆不下飲食四肢微
冷腹脇痞滿

訶梨勒

三分

陳皮

一兩湯浸去白

甘草

一分

桂心

當歸

微炒

丁

香 藿香 木香 白朮 附子

去皮

乾薑

右為散每服三錢水一中觔生薑三枚煎六分去滓不
計時稍熱服

木瓜湯 治產後嘔逆日漸成吐

木瓜切 白朮 藿香葉 甘草 五味子 白茯苓

苓 陳皮去白皮 草豆蔻去皮 人參各一兩 乾薑半兩

右搗篩每服二錢淨水一鍾煎七分去滓溫服不拘時

丁香散 治產後脾胃氣寒心胃滿悶吐逆四肢少力
不納飲食

丁香 人參 枳榔 白朮 桂心 當歸 厚

朴 前胡 甘草 良薑

各半兩

右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎七分去滓空

心服

人參湯 治產後嘔逆不進食

人參

桂

去粗皮

陳皮

去白

厚朴

薑製

半夏

薑汁製

當歸

白朮

藿香

各一兩

丁香

半兩

右搗篩每服三錢淨水一盞生薑三片煎七分去滓

溫服不拘時

白朮湯 治產後嘔逆飲食不下

白朮

枇杷葉

去毛

桂

去粗皮

當歸

枳殼

去穰

人參

甘草

麥蘖

一兩

乾薑

炮半兩

右搗篩每服三錢淨水盞半煎七分去滓溫服不拘

時

藿香湯 治產後嘔逆不下食心腹虛脹

藿香

去梗

訶梨勒

炮

甘草

炙

陳皮

人參

白朮

各一兩

白豆蔻

去皮

麴

各半兩

草豆蔻

半兩

右為散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破煎七分去滓溫服不拘時

人參散 治產後虛羸嘔逆飲食不下

人參

一兩去蘆

麥門冬

三分去心

黃耆

一兩

半夏

湯浸七遍去滑

桂心

各半兩

白茯苓

三分

陳皮

當歸

半兩

厚朴

三分薑製

右為散每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時服

枇杷葉散 治產後血氣壅滿心煩嘔逆不下飲食

枇杷葉半兩紅藍花一兩桂心半兩當歸三分赤芍藥三分人

參三分蘆根三分白朮半兩枳殼半兩去核

右為散每服四錢水一中盞生薑半分去滓不計時

溫服

厚朴湯 治產後嘔逆不進飲食

厚朴薑製人參 白朮 沉香 白茯苓去皮烏藥

甘草炙藿香葉各一兩

右搗篩每服三錢水一饒煎至七分去滓不拘時服

大壯氣丸 治產後惡心

白朮 乾薑 半夏麴 桂心 當歸

酒浸

白豆蔻

焙

丁香

各半兩

甘草

炙二錢半

右為細末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯送下

檳榔湯

治產後胃氣虛嘔逆不止或吐食不納

檳榔

白朮

當歸

京三稜

煨

桂

蓬莪朮

厚朴

薑製 陳皮

各一兩

右搗篩每服三錢淨水一椀煎七分去滓溫服不拘

時

溫中散 治產後胃冷嘔逆

陳皮

一兩半

乾薑

炮半兩

白朮

麥門冬

去心

甘草

炙

人參

各一兩

訶梨勒

炮去核半兩

右為散每服二錢煎沸湯調下不拘時服

丁香丸

治產後胃氣虛冷嘔逆

丁香

半兩

兩檳榔

三分

當歸

人參

厚朴

薑汁製

半

夏

湯浸七遍去滑各一兩

金匱要略卷之八
卷三十四
右為末生薑汁煮麵糊為丸梧桐子大每服二十九
生薑陳皮湯下不拘時

又丁香丸 治產後嘔逆不下飲食心胃噎悶一名白

豆蔻丸

丁香 吳茱萸炒各半兩 白豆蔻去皮桂各三分 橘皮去白 訶

梨勒煨去核各半兩 木香一分

右為末研勻煉蜜和調丸如梧桐子大每服二十九
桃仁醋湯下不拘時一方用橘湯下

白朮散

治產後腹中痛嘔逆飲食不下

白朮

麥門冬

去心焙

厚朴

薑汁製

人參

橘皮

湯浸去白

當歸

各一兩

桂心

一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

不計時服

開胃散

治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食

訶子肉

一兩半

人參

一兩

甘草

半兩

半夏

半分

生薑

一分

薤白

二七

右為末別以半夏生薑薤白水一大觔煎六分去滓
分為二服

丁香散 治產後嘔逆膈腕痞悶不思飲食并脾胃傷
冷心胃氣滯不止一名厚朴散

丁香

去梗

枳殼

去穰
麩炒

芎藭

各半
兩

草豆蔻

一兩

厚朴

薑製
去皮

白朮

各三分

右為散研勻每服二錢宜煎吳茱萸醋湯調下不拘
時一方單用醋湯

人參散 治產後血氣未和心煩嘔逆不下飲食

人參

分三

胡麻

兩一

紅藍花

兩一

生地黄

分三

甘草

兩半

葛根

分三

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓不拘時服

治產後嘔逆不止咳噫氣亂心煩宜服此方

生薑汁

蜜

薄荷汁

各一合

酒

二合

右煎一兩沸投酒再煎放溫分三服

療產後嘔逆不止

橘紅

兩一半夏麴

甘草

各半兩

藿香

三兩

右為細末每服二錢約以水一盞半薑三片煎六分

不拘時服

草豆蔻散 治產後嘔逆不止氣虛心煩

肉桂

兩半桃仁

去皮尖雙仁麴炒

草豆蔻

各三分

甘草

一分

右為散每服三錢水一盞生薑七片煎七分去滓溫

服

肉豆蔻散

治產後心腹疼痛嘔逆清水不下飲食

肉豆蔻

去殼

檳榔

人參

桂心

各半兩

右為末以粥飲調下一錢不計時

丁香散

治產後嘔逆不止

方見本門
咳逆類

人參枳殼散

治產後惡心不下食

人參

半兩

枳殼

一分
去核

陳米

二合綿
上煨熟

右為細末每服二錢溫水調下

琥珀膏

治產後血氣上攻嘔逆煩悶

方見本門
血暈類

治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮

五

生薑

六

右細切酒水各二升煎取一升分三服一方無酒煎
治婦人產後惡心不思飲食者

生薑

小馬蹄香

各等分

右二味搗酒一盞服立効

抵聖湯

治產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血

散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受

之則不能受納水穀而成吐逆醫者不識若以尋常
治腹心痛藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾
愈難治服抵聖湯則愈

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮

各一分

甘草

一錢

右咬咀每服水一碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓
分熱三服

喘促

附論

夫產後喉中氣急喘促者何答曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹血去喘自定○若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調散用桑皮杏仁煎湯調下傷食宜服見現

圓五積散○治肺熱悶不止胃中喘急客熱往來欲死
不堪服藥者此可以治胃中喘氣用桃皮芫花各一升
二物以水四升煮取一升半取去滓以布蘸汁薄胃再
蘸再薄即効○產後虛喘者由臟腑不足氣血虛傷敗
血衝心上搏於肺肺主氣氣與血并故令喘急也○產
後氣虛血弱腠理開踈感冒寒邪搏流肺經則氣道不
利痞滿胃中乃有上氣喘急之證

方

紫苑湯 治產後上氣咳逆煩悶

紫苑

去土

人參

陳皮

去白

紫蘇莖葉

訶梨勒

去核

枳

殼

去核

細辛

去苗

郁李仁

去皮尖
研如膏

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁麤炒

桂

赤茯苓

甘草

當歸

各一兩

大黃

半兩炒

右搗篩每服二錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

治產後上氣及婦人賁豚氣積勞臟氣不足胃中煩躁

關元以下如懷五千錢狀

厚朴 桂心 當歸 細辛 芍藥 石膏 桔

梗

各三兩

甘草

黃芩

澤瀉

各二兩

吳茱萸

五兩 千金翼作

大黃

乾地黄

四兩

乾薑

一兩

右咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服服三

劑佳

人參湯 治產後上氣喘急煩悶

人參

陳皮

去白厚朴薑汁製

麻黃

去根

白前

防己

桑

皮

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒

當歸

訶梨勒

去核各一兩

右搗每服二錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘時

大腹湯 治產後上氣喘急滿悶

大腹皮

前胡

去蘆 檳榔

百部根

陳皮

去白

枳實

麩炒

桑皮

杏仁

去皮尖雙仁麩炒

當歸

人參

各一兩

右搗篩每服二錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

地黃散 治產後體虛微喘汗出乏力腹內疼痛

熟地黃

一兩

牡蠣粉

一兩

白朮

三分

黃耆

三分

當歸

甘草

桂心 五味子 芎藭 赤芍藥

各半兩

右為末每服三錢水一盞生薑半分煎六分去滓不計時服

黃耆散 治產後虛損喘促氣力乏少食飲不進

黃耆 一人參三分 甘草 桂心 熟地黃 當歸

白茯苓 麥門冬 去心 白朮

右為散每服三錢水一鍾薑半分棗三枚煎六分去滓不計時服

五味子散 治產後血海氣虛上攻於肺時或喘促不

欲飲食四肢乏力

五味子

訶梨勒皮

一兩

人參

一兩

熟地黄

一兩

桂心

半兩

菖蒲

半兩

白茯苓

一兩

黃耆

三分

鍾乳粉

一兩

右為散每服四錢水一觔薑半分棗三枚煎六分去

滓不計時服

杏仁飲

治產後上氣喘急

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

紫蘇莖葉

麻黃

麥門冬

去心

五味子 桑皮 甘草 陳皮

去白各一兩

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓不拘時服

桑根白皮湯 治產後上氣虛喘欬逆

桑皮 款冬花 五味子 杏仁

去皮尖雙仁炒

當歸

人參 甜葶藶 防已

各一兩

右搗篩每服三錢淨水一盞煎七分去滓不拘時服

紫蘇子飲 治產後肺氣上喘煩悶

紫蘇子 人參 陳皮 大腹皮 桑皮 甜葶

蘼

紙上炒

甘草

炙

當歸

各一兩

右搗篩每服二錢水一盞煎六分去滓不計時服

赤茯苓飲 治產後上氣喘急

赤茯苓

去皮

甜葶藶

紙上炒

桑白皮

當歸

枳殼

去白

細辛

去土

郁李仁

去皮尖

桂

各一兩

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不計時

潤氣煎 治產後喘急上氣咽嗑不利

陳皮

紫苑

去土

人參

甘草

紫蘇

杏仁

湯浸去皮尖

五味子

各一兩

右為細末蜜半饒姜自然汁三分同藥和勻置瓷器

中甑上蒸熟每服半匙許熱湯化下不拘時

五味子散 治產後虛喘氣少不足四肢羸困不欲飲

食

五味子 人參 當歸 黃耆 芎藭 白茯苓

各一兩

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓不計時溫服

桂心散 治產後血氣上攻於肺虛喘

桂心

陳皮

人參

當歸

各一兩

紫蘇子

半兩

五味

子

半兩

右為末每服一錢不計時粥飲調下

橘皮散 治產後上氣胃膈不利

青橘子

去白

訶梨勒

去核

紫蘇子

杏仁

湯浸去皮尖

甘草

各半兩

右為散每服二錢匕煎桑皮湯下不拘時

參蘇飲 治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者為

孤陽絕陰不治者

人參

一兩為末

蘇木

二兩槌碎

右以水兩碗煮取一碗以下去滓調參末隨時加減
一方各一兩每服五錢水二盞煎七分頻頻呷服
治產後氣喘為孤陽絕陰不治者

胡桃核肉

不必去皮

人參

各等分

右呖咀每服五錢水二盞煎七分頻頻呷服

短氣

附論

夫呼出心與肺吸入腎與肝呼吸應息則人氣平調產後肺氣不足呼吸升降不至舒快故為短氣之病短則脈短內經所謂短則氣病難經所謂前小後大即胃滿短氣是其證也

方

白朮湯 治產後短氣力乏言語不利

白朮

人參

杏仁

湯浸去皮尖炒

甘草

陳皮

去白

厚朴

薑汁

枳實

麩炒

木香

當歸

熟地黄

各一兩

右搗篩每服三錢淨水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓服不拘時

地黄飲 治產後氣短呼吸促迫

熟地黄

焙

當歸

人參

白朮

白茯苓

烏藥

沉香

青皮

去白

甘草

桂

去粗皮各一兩

右咬咀如麻豆每服五錢淨水一盞半薑三片棗二枚擘破煎八分去滓不拘時日三

人參湯 治產後短氣上膈壅悶

人參 訶梨勒去核 木香 五味子 白茯苓 陳

皮去白 白朮 杏仁湯浸去皮

尖各一兩

右搗篩每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服不拘時

前胡湯 治產後肺氣不足短氣虛乏

前胡去蘆頭 半夏為末 白朮 人參 甘草 桔

製作餅

梗各一兩 訶梨勒去核 麥門冬去心

三分

右搗篩每服三錢淨水一盞薑三片棗一枚煎七分

去滓溫服日三

枳實半夏湯 治產後氣短不足

枳實

去核

半夏

薑汁製為末作餅子焙

木香

乾薑

各半兩

五味

子

三分

人參

青皮

湯去白

甘草

炙一兩

右搗篩每服三錢水一盞薑三片棗一枚擘破煎七分

去滓溫服不拘時

當歸建中湯 治產後勞傷虛羸不足腹中疼痛吸吸

少氣小腹拘急連腰背時自汗出不思飲食產訖直至滿月每日三服令人丁壯強健

當歸

四兩三兩

芍藥

六兩

甘草

炙二兩

右吹咀如麻豆大每服五錢淨水一盞生薑一片大棗三枚拍碎煎八分去滓溫服日三若大虛加飴糖少許湯飲下

半夏丸

治產後短氣

半夏

去滑洗七遍一兩

人參

枳實

去核麩炒半兩

訶梨勒

煨去核三分

右為末用生姜自然汁煮麵糊丸如梧桐子大每服
一十九生薑紫蘇熟水不拘時日三服

主產後氣短頭旋體虛欲危

麥門冬

分六

淡竹葉

片三十

防風

分三

旋覆花

分二

葛根

分三

人參

分二

小麥

分三

石膏

分六

右剉為散水二升煎至半升去滓服

產後短氣欲死心中煩悶不解

甘草

兩一

生薑

兩三

大棗

兩十二

竹葉

麥門冬

小麥

各一
升

細切水一斗煮竹葉小麥取八升入藥煮三升温服
若虛悸加人參二兩少氣力加粳米五合一方更加
茯苓

泄瀉
附論

夫產後腹痛及瀉痢者何答曰產後脾胃虛怯寒邪易
侵若未滿月飲冷當風風冷乘虛襲於盲膜散於腹脇
故腹疼作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉

腹鳴或下赤白胕脇腹脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之○產後氣血俱虛飲食易為傷動脾胃不和水穀不化故腹滿腸鳴而為泄瀉更遇寒氣則變為帶下矣

方

加味五積散 治產後因食動傷腹痛至甚水穀不化
洞瀉腸鳴除麻黃加高良薑熟綿附子生薑烏梅紅
棗煎服之效

地榆散 治產後泄瀉不止煩渴困倦不思飲食

地榆 桂 草豆蔻 黃連 各二分 去蘊 檳榔 剉 當歸

切 肉豆蔻 去殼 阿膠 炒 木香 炮 丁香 烏頭 去皮 臍 枳

實 良薑 炒各 半兩

右為散每服二錢匕溫酒調下米飲亦得食前

附子丸 治產後虛冷泄瀉不止臟腑冷痛腹脹滿悶

附子 木香 當歸 甘草 乾薑 芍藥 厚

朴 吳茱萸 陳皮 訶梨勒 黃連 白朮

右為末薄麪糊和九如梧桐子大每服三十九米飲

下食前服

龍骨九 治產後日久泄瀉倦怠煩渴

龍骨 甘草 赤石脂 烏梅肉 人參 黃芩

去黑 枳殼 去穢 赤茯苓 各半 黃連 厚朴 薑製各三分

右為末麪糊和梧桐子大每服三十九米飲下食前

日三

阿膠丸 治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止



阿膠

四兩

人參

甘草

龍骨

桂心

乾地黄

白朮

黃連

當歸

附子

各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大溫酒服二十九日三

調中湯

治產後腹痛又瀉痢或成赤白或洞瀉腸鳴

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子

川芎

各一兩

兩甘草

半兩

右為粗末每服三錢淨水三盞煎一盞去滓熱服

評曰產後下痢非止一証當隨所因而調之既云飲冷

當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從自性况勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白帶下非此能愈各隨門類別有正方今錄桃膠散白翁湯以備用餘從帶下門選之

阿膠丸 治產後泄瀉腸滑不止

阿膠

炒

黃栢

去粗皮

人參

乾薑

當歸

醋石榴

皮

各一兩

右為末麩糊和丸梧桐子大每服三十九食前米飲

白朮丸 治產後冷滑泄瀉不止

白朮

火燒一兩

赤茯苓

生地黄

乾薑

陳皮

半兩

右為末薄麴糊和丸梧桐子大每服五十九食前米

飲下

厚朴湯 治產後泄瀉久不止不思飲食

厚朴

薑汁炙二兩

生地黄

蒼朮

一兩當歸

五分

酸石榴皮

半兩

右為散每服三錢淨水一盞煎七分去滓溫服

人參丸 治產後瀉痢不止

人參 草豆蔻

訶梨勒

炮去核

甘草

炙各一兩

白礬

熱令

盡半兩

右為末麵糊和丸梧桐子大每服三十九米飲下食

前服

木香湯 治產後熱痢不止

木香

黃連

去鬚各一兩

訶梨勒皮

炮三分

龍骨

火燒紅半兩

厚朴

去粗皮薑汁三分

右搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓空心溫服
厚朴湯 治產後泄瀉不止

厚朴

去粗皮薑汁炙剉

乾薑

炮

白朮

各一兩

甘草

炙半兩

陳皮

去白

三分

右呖咀每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服食前
四君子湯 治產後腹微疼泄瀉不止烏陳米煎湯調
下

赤石脂丸 治產後久瀉不止

赤石脂

人參

各一兩

乾薑

炮半兩

龍骨

三分

右為末麵糊和丸梧桐子大每服三十九食前米飲

下

四勝丸

治產後水瀉不止

代赭

乾薑

龍骨

各一兩

附子

去皮臍三分

右為末麵糊和丸梧桐子大每服二十九米飲下空

心服

熟艾丸

治產後冷瀉日久不止

熟艾

四兩附子

去皮

陳皮

白乾薑

各一兩

右為末麵糊丸梧桐子大每服三十九食前米飲下

肉豆蔻散 治產後冷瀉不止

肉豆蔻

一兩

生薑

三合

細麵

二兩

右二味用薑汁調作餅子慢火炙乾再焙搗羅為散
每服二錢用米飲調下日三服

治產後腹痛瀉痢 腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲

冷當風風冷乘虛襲於育膜散於腹脇腹痛如刺水

穀不化洞瀉腸鳴或結為赤白走痛不定

生薑自然汁

分二濃米飲一分

右調勻放溫先以溫米飲一二口通咽路却取汁不住口服盡却以米飲嗽口吞下立見神效甚妙此飲食傷冷所致

的奇散 治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉分過則愈雖洞泄不禁下青黑色物亦驗因食傷動用調十湯

右用荊芥大者四五穗於釜內燃火燒成灰不得犯
油火入麝香少許研沸湯一兩呷調下此藥雖微能
愈大病宜勿忽之

治產後泄瀉不止臍腹撮痛方

白礬

燒汁
盡

附子

去皮臍
各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九丸溫米飲下

食前

厚朴湯

治產後泄瀉腹痛嘔逆不能食

厚朴

去粗皮薑汁二兩

白朮

炒一兩

右搗篩每服五錢淨水一盞半煎八分去滓空心服

治產後泄瀉不止

用艾子一兩微炒為末每服一錢溫酒調下

療產後遺糞

礬石

枯牡蠣各等分

右為末酒飲服方寸匕日三亦治男子

療產後出糞不知遺時

方

白飯 芍藥

各等分

右為末方寸匕酒服

療產後遺糞

取故燕窠中草燒為末以酒調下半飯亦治男子

下痢

附論

夫產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或動勞太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷

乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令
洞泄或甚者變為痢也若血滲大腸則為血痢難治世
之謂產子痢是也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或
為驟血若冷熱相無則赤白或膿血相雜若已青色則
極冷也若飲食不進便痢無常日夜無度產後本虛更
加久痢不止無力瘦乏謂之虛下痢又有產後氣宇不
順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之
冷熱相搏則調之滑者澀之虛者補之水穀不分者當

利小便若產婦性情熱者不能寬解須當順其氣未有不
不安者也○產後下痢作渴水之精化為血氣津液以
養臟腑虛燥故痢而渴若引則難止反溢水氣脾胃既
虛不能克水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴
則痢自瘥○產後勞臟腑不足或飲食乖度傷胃虛弱
水穀不消冷熱之氣乘之於血血滲腸間與腸間津液
相雜而下故成膿血痢也

方

澤蘭湯 治產後痢疾赤白若膿裏急胃脇滿痛欬嗽
嘔血寒熱小便赤黃大便秘

澤蘭

石膏

各二十
四銖

當歸

甘草

厚朴

各十
八銖 遠

志

三十
銖

藁本

川芎

各十
五銖

乾薑

人參

桔梗

乾地黄

各三
十銖

白朮

蜀椒

白芷

栝子仁

山

茱萸

細辛

各九
銖

桑皮

麻子仁

各半
升

右㕮咀以水一斗五升先用桑白皮煮取七升半去

之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

藍青丸 治產後下痢

藍青熬 附子 鬼臼 蜀椒各一兩半 厚朴 阿膠

甘草各一兩 艾葉 龍骨 黃連各一兩 當歸各三兩 黃蘗

茯苓 人參各一兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心飲下一方用赤石脂四兩

療產後赤白腹中絞痛不下食

當歸 石榴皮 地榆各三分 白裹荷 黃連各十

分二黃蘗分一犀角屑分四黃芩分一枳殼甘草升麻

各六分茜根分八粳米分三薤白分一

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心粥飲吞下二十九
龍骨散 治產後久痢腹中疼痛不欲飲食

龍骨一兩肉豆蔻三分厚朴一兩白朮三分艾葉三分

炒乾薑半兩人參去蘆半兩訶梨勒一兩當歸一兩地

榆半兩白頭翁半兩木香半兩

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎六分去滓溫

服

溫脾丸 治產後脾胃虛冷水穀不化脹滿或時寒極

及下痢

乾薑 人參 桔梗 甘草 各三分 法麴 五合 桂 去粗皮五

兩附子 炮裂去皮臍 細辛 各二兩去苗土 枳實 三枚去穰炙 吳茱萸

大麥芽 炒各五分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下加

至三十九日三

木香散

治產後赤白痢腹中疼痛不欲飲食

木香

半兩

厚朴

一兩去粗皮薑汁製炒令香

訶梨勒皮

一兩

甘草

炙

黃連

一兩去

白朮

三分

當歸

一兩

龍骨

一兩

脂

乾薑

半兩

阿膠

三分

黃

右為細末不計時以粥飲調下二錢

阿膠散

治產後膿血痢不止腹中疼痛不欲飲食漸

加羸弱

阿膠

三分

人參

三分

黃耆

三分

乾薑

三分

當歸

三分

熟地黄

三分

芫窮

半兩

白茯苓

半兩

陳皮

半兩

艾葉

半兩

赤

石脂

二兩

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

烏梅散

治產後膿白痢及水穀不化臍下疼痛

烏梅肉

一兩炒

龍骨

二兩

乾薑

一兩炮

赤石脂

三兩

甘草

半兩

炙礬

黃連

一兩去鬚炒

人參

一兩

白朮

一兩

當歸

一兩

阿膠

一兩

搗碎

艾葉

一兩炒

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

烏梅丸 治產後冷熱久下不止

烏梅

三百枚

當歸

四兩

乾薑

炮十兩

桂

去粗皮六兩

黃連

十六兩

黃蘗

十六兩

鬚

附子

去皮臍六兩

蜀椒

去目閉口者炒出汗四兩

人參

黃蘗

各六兩

兩

右除烏梅外各為末再合和勻以苦酒漬烏梅一宿

去核蒸之搗如泥盤中與藥搜令相得煉蜜和杵二

千下丸如梧桐子大每服十九食前米粥下加至二

十九日三

當歸芍藥湯 治產後赤白痢臍腹疼痛一方名當歸

飲有黃耆無黃連

當歸 芍藥 地榆 龍骨 火燒紅 黃連 去鬚各一兩 厚

朴 去粗皮三分 艾葉 炙 甘草 炙 黃芩 去黑心 乾薑 炮各三兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服即瘥忌

生冷油膩海藻松菜猪魚肉

赤石脂丸 療產後下痢虛冷青色驚澹

赤石脂 三兩 甘草 當歸 白朮 黃連 乾薑

秦皮

各二兩

川椒

附子

各一兩

右為細末煉蜜九如梧桐子酒下二十九日三良忌

猪肉海藻松菜

千金方作散酒服方寸匕

白豆蔻散

治產後冷痢臍下痛不能食

白豆蔻

白朮

甘草

肉豆蔻仁

芍藥

白

茯苓

各三兩

桂

去粗皮

陳皮

各半兩

枳殼

去穢麩炒一分

右為散每服二錢匕空腹米飲調下

木香散

治產後赤白痢臍腹撮痛

木香

兩半

甘草

兩

炙半

阿膠

三兩

地榆

兩

當歸

三兩

赤

芍藥

黃連

一兩

去須

訶梨勒皮

一兩

熟乾地黃

一兩

黃耆

半兩

右為散每服三錢水一鍾煎五分去滓食前溫服

赤石脂散 治產後膿血痢腹中疼痛不可忍

赤石脂

龍骨

一兩

黃連

去須

當歸

三兩

乾薑

半兩

炮

艾葉

半兩

阿膠

半兩

黃蘗

半兩

黃耆

半兩

黃耆

半兩

乾薑

半兩

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

乾薑散 治產後膿血痢腹中疼痛四肢逆冷

乾薑

半兩 炮

當歸

半兩 炒

川椒

半兩 去目 閉口者炒

白朮

一兩

艾葉

一兩 炒

熟地黃

一兩 縮砂

半兩 去皮

甘草

半兩 炒

赤石脂

一兩

右為末每服二錢粥飲下日三四服

當歸湯

治產後下痢赤白腹痛

當歸

龍骨

各三兩

乾薑

白朮

各二兩

芎藭

甘草

白艾

熟者 附子

各一兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓分三分一日令盡

服藥忌猪肉冷水桃李雀肉毒物

療產後下痢赤白有血

赤石脂

黃連

地榆

各六分

當歸

四分

乾薑

甘草

各三分

厚朴

十二分

蔥白

七莖

右水二升煮取八合空心分二服一方薤白三寸煎

無蔥白

療產後久痢津液竭渴不止

龍骨

十二分

厚朴

茯苓

黃耆

麥門冬

人參

各八分

生薑

六分

大棗

十四個

右水二升煮取八合空心分二服再以水一大升煮取七合空心分兩服

當歸丸

治產後血痢結澁疼痛

當歸

炒

白朮

甘草

炙各一兩半

桂

去粗皮

人參

各三分

桑

白皮

乾薑

炮一方用生薑

細辛

去苗土各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下空心日三服一方用溫酒下

阿膠散

治產後痢赤如血煩熱渴燥腹疼不思飲食

漸加羸瘦

阿膠

炒

黃連

去積

黃蘗

芍藥

地榆

甘草

炙虎

杖

酒浸

艾葉

各一兩半

右為散每服二錢用米飲調下食前日再服一方有

乾薑無虎杖名艾葉散

附子丸

治產後冷痢不食腹痛乏力

附子

一兩炮製去皮

當歸

三分

艾葉

三分微炒

訶梨勒皮

半兩

厚朴

三分去皮薑製

木香

半兩

吳茱萸

半兩湯浸七遍

右為末醋煮飯和丸梧桐子大不計時每服三十九

粥飲下

木香丸 治產後心腹氣痛泄痢不止

木香

半兩

訶梨勒皮

一兩

龍骨

一兩

附子

炮去皮臍

黃連

一兩

去乾薑

一兩

當歸

一兩

吳茱萸

浸七遍炒半兩

右為煉蜜丸梧桐子大每服二十九粥飲下日三四

服

黃連丸 治產後赤白痢日夜數十行腹中疼痛

黃連

一兩
去鬚

烏梅肉

三分
炒

敗龜

三分
酥炙黃

鹿角屑

半兩
微焙

黃

乾薑

半兩
炮

當歸

一兩
炒

阿膠

半兩
搗碎
炒令黃

椰角皮

一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸粥飲下不

計時

白朮散

治產後赤白痢腹痛不思飲食

白朮

一兩
兩赤芍藥

一兩
兩當歸

一兩
兩黃連

去鬚
炒

厚朴

薑汁
炙

黃

芩肉豆蔻

乾薑

各一
兩炮

右為末以棗瓤杵丸如梧桐子大不計時艾葉煮粥

飲下三十九

產後以酒吃藥因飲不飲亦作瀉痢非此神方不能治

人

神麴

二錢

人參

枳殼

各一錢

赤石脂

三錢

白朮

熟地

黃

各二錢

計一兩一錢細末挑三錢空心米飲下又服白頭翁

湯亦可

桂蜜湯

治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹

痛時下血

桂心

甘草

乾薑

二兩

附子

一兩

蜜

一升

當歸

三兩

赤石

脂

十兩

右㕮咀以水六升煮取三升去滓內蜜煎一兩沸分
三服日三

生地黄湯

治產後忽着寒熱下痢

生地黄

五兩

甘草

黃連

桂心

各一兩

大棗

十枚

淡竹

葉

二升一作竹葉

赤石脂

二兩

石咬咀以水一斗煮取竹葉取七升去滓內藥煮取
二升半分三服日三

治產後赤白痢臍下氣痛不可忍并腹絞痛

一名黃九

黃連

四兩

阿膠

蒲黃

梔子仁

各一兩

當歸

一兩半

黃

芩

一兩

黃柏皮

三兩

右細末煉蜜丸如梧桐子大飲下六十九日三夜一
立定破血止痢

療產後虛羸下痢膿血腹痛

黃連 芍藥 甘草 當歸 乾薑 人參

各八兩

艾葉

三分

右呖咀水七升煮取二升分三服忌猪鹿肉

治產後痢赤白臍下氣痛

製朴

四錢

當歸

三錢

枳殼

訶子

甘草

各三分

薤白

一合

肉豆蔻

三錢煨

右每服四錢水盞半煎大半碗去滓空心服

斷下散 治產後血痢臍腹疼痛

右用四物湯內加槐花黃連御米穀去頂炒等分為末每服三錢水盪半粟米一撮煎八分去滓溫服此方雖用粟殼以其前四味類婦人四物湯但芍藥赤耳亦先活其氣血黃連肥腸厚胃槐花鮮熱殼粟從其類故耳

黃耆湯 治產後赤白痢膿血相無疼痛一方為末飲服方寸匕

黃耆 一兩 赤石脂

兩 阿膠 炒

黃連

去鬚各一兩

白朮

一兩 黃

栝三龍骨一兩半

燒紅

右搗篩每服二錢用水一盞煎七分去滓溫服日二

夜一

白朮湯 治產後心腹脹滿飲食不消時作水痢

白朮 厚朴薑汁 草苴菹去皮 枳殼去穢 白茯苓

三分

三分

去皮木香 人參各半

兩

右剉細每服五錢用水一盞煎八分入生姜三片去

滓溫服日二

白朮散 治產後冷痢臍下痛羸瘦不能食

白朮

芍藥

各三分

木香

半生半炒

縮砂仁

黃連

去鬚各半

兩

陳麴

炒一兩半

厚朴

姜汁炙一兩

右為散每服二錢乾薑米飲調下

地榆湯 治產後血痢不止臍腹疼痛

地榆

芍藥

各三分

木香

當歸

甘草

炙

阿膠

搗碎

各半兩

乾薑

炮一分

右搗篩每服五錢用水一盞半煎八分去滓溫服

芍藥丸 治產後赤白痢

白芍藥

艾葉

各一兩

地榆

當歸

焙

白朮

各三分

龍

骨

碎

乾薑

各半兩

右為末米醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米

湯送下

紫桂丸

治產後痢疾

桂

甘遂

丁香

芫花

醋炒焦

木香

巴豆

去油

硃砂

各等分

右為末醋麵糊丸如小豆大每服二九至三九溫水下加減更量虛實此丸取積窳勝不以久近皆能化逐產後積滯尤妙

治產後痢日五十行者

右取木裏蠹虫糞鐺中炒之令黃急以水沃之稀稠得所服之即止獨孤祭酒秘方

治產後痢無不瘥 用訶黎勒皮一兩酥炒為末每服二錢溫酒調下

當歸散 治產後下痢腹中疼痛

當歸

一兩炒

乾薑

一兩

赤芍藥

半兩

芍藥

半兩

甘草

半兩炙

熟

地黃

一兩半

艾葉

一兩半炒

右為散每服三錢水一鍾煎六分去滓溫服日三四服

橡斗子散 治產後休息痢

橡斗子灰

二錢

白礬灰

二錢

蜜陀僧

半錢

自然銅

半錢

龍骨

錢亂髮灰

二錢

麝香

半錢細研

右為末每服半錢食前粥飲調下

附子散 治產後膿血痢日夜數十行疼痛不止

附子

半兩炮去皮臍

乾薑

半兩炮

川椒

半兩去目閉口者炒

甘草

三分炙

白朮

三分

黃耆

三分

赤石脂

二兩

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

白頭翁湯 治產後下痢虛極

白頭翁

劉寄奴花亦可

甘草

各二兩

阿膠

各二兩

黃連

各二兩

陳皮

各三兩

右咬咀每服四錢水碗半煎至七分去滓空心服日

三

膠蠟湯

治產後三日內下諸雜五色痢

阿膠

黃蘗

各一兩

蠟

三錢

當歸

一兩半

黃連

二兩

陳廩米

一升

右咬咀以水八升煮米蟹目沸去米內藥煮二升去滓內膠蠟令烊分四服一日令盡一方無黃蘗

治產後下赤白痢腹中絞痛

一名救急散

芍藥

乾地黄

各五兩

甘草

阿膠

艾葉

當歸

各二兩

右㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服空心

黑散 治產後下痢

麻黃

貫衆

桂心

各一兩

甘草

乾漆

各三兩

細辛

二兩

右治下酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

龍骨散 治產後五色痢

龍骨 代赭 黃蘗根皮

蜜炙 令焦

艾

各一兩半

黃連

二兩

赤石脂

一兩半

右治下篩飲服方寸匕日三

療產後水痢

黃連

六分

烏梅

五分

赤石脂

石榴皮

當歸

各四兩

乾

薑

三分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三十九

療產後血痢

艾葉

三分

阿膠

十分

黃連

七分

芍藥

黃柏

甘草

各六分

右為末粥飲調下方寸匕外臺秘要有地榆

治產後大小便血痢

黃芩

蒲黃

車前子

牡蠣粉

芍藥

乾地黃

各等

分

右為末米飲下食前調一錢服忌麪蒜

理中湯

治產後虛證下痢純白腹痛裏急後重手足

冷加木香煨肉豆蔻每服三錢陳米鹽烏梅煎空心

服

方見大人
科泄瀉類

黃連散 治產後冷痢不止

黃連

去
鬚

乾薑

訶梨勒

去
核

地榆

各一
兩

甘草

半
兩

烏梅

肉

三分

右為散每服二錢用陳米飲調下食前服

黃連丸 治產後赤白痢

黃連

一
兩

阿膠

炙

當歸

切

乾薑

各三
兩

甘草

炙一
分

赤茯苓

苓

半兩
去皮

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心米

飲下

乾薑散

乾薑

一兩
炮

人參

半兩
去蘆

枳殼

去白麩
炒半兩

赤石脂

一兩

白朮

三分
神麴
一兩炒
微黃

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

乾薑丸 治產後冷痢久不瘥

乾薑

一兩炮

黃連

二兩去鬚炒

當歸

一兩

烏梅肉

二兩炒

熟地

黃

二兩木香

二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九粥飲空心下

日三四服

黃耆散

治產後赤白痢日夜數十行心腹疼痛

黃耆

三兩地榆

二兩紫參

三兩黃蘗

二兩炙

厚朴

薑汁炙三兩

黃

連

一兩去鬚炒

右為散每服三錢水一中盞入薤白三莖煎六分食

前去滓溫服

當歸散 治產後赤白痢不止

當歸一兩犀角屑一兩黃芩一兩黃連一兩白朮一兩地榆一兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時溫服

黃連散 治產後三日內患膿血痢腹中疼痛不止

黃連一兩黃栢一兩阿膠一兩當歸一兩龍骨一兩

木香三分

石為散每服三錢水一大盞入陳米半合煎五分去滓溫服日三四服

治產後赤白痢心腹刺痛

薤白

一兩當歸

二兩

酸石榴皮

三兩

地榆根

四兩

粳米

五合

右㕮咀水六升煮取二升半去滓分三服必効一方

加厚朴一兩阿膠人參甘草黃連各一兩半聖濟總

錄有大黃豆糯米無粳米黃豆五合糯米二合

鰲甲湯

治產後早起中風冷泄痢及帶下

鱉甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃蘗

長一尺廣三寸

右咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三千金

翼加白頭翁一兩

乾地黄湯 治產後下痢

乾地黄

二兩

白頭翁

黃連

各一兩

蜜蠟

一方寸匕

阿膠

如手

掌大

一枚

右咬咀水五升煮取二升半去滓內膠蠟令烊三服

日三千金翼用乾姜一兩

療產後赤白痢疾

黃連

分八

阿膠

分六

赤茯苓

當歸

黃蘗

分各四

右為末煉蜜丸如梧桐子大粥飲吞下二十九空心

一方用乾薑炮三分

又療產後赤白痢臍下氣痛

當歸

分八

厚朴

黃連

分各十

肉豆蔻

枝五

甘草

分六

右咬咀水一盞煎七分去滓溫服日三

療產後羸困赤白痢疾心腹絞痛

薤白

石榴皮

黃連

各三分

當歸

一分

地榆

二分

右以水七升煮取二升半分為三服

療產後水痢

當歸

三分

枳殼

四分

厚朴

茯苓

黃連

各六分

右以水一升煮取八合空心分為三服

烏梅黃連丸

治產後赤白痢腸腹疼痛

烏梅

去核炒

黃連

去鹽

當歸

阿膠

炒令燥各一兩

蠟

一兩半

右除蠟外為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米

飲下日三服

黃連丸 治產後赤白痢腸鳴腹痛

黃連

當歸

胡粉

阿膠

炒各一兩半

無食子

二枚

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前米

飲下

訶梨勒散 治產後血痢腹痛不止

訶梨勒

炮去核

阿膠

炒令燥

黃蘗

地榆

甘草

炙各等分

右為散每服三錢米飲調下食前日三

木香散

治產後氣痢不止腹痛

木香

三分

訶梨勒

半生半煨去核一兩一分

當歸

白朮

肉豆

蔻

去殼各半兩

右為散每服二錢陳米飲調下

治產後患水痢

神麴

末五合熬六月六日煮

人參

四分

枳實

炙六分作枳殼

赤石脂

十分

白朮

六分

右搗散米飲下方寸匕漸漸加之忌桃李雀肉等一方

有熟地黄

白頭翁丸

治產後下痢不止

白頭翁

一兩

乾薑

一兩

黃連

一兩

地榆

一兩

阿膠

一兩

搗碎

右為末黃蠟消丸如梧桐子大每服二十九食前粥

飲下

薤白飲子

治產後赤白痢心腹疼痛不能飲食

薤白

切二合

甘草

半兩

黃連

一兩

木香

半兩

去

兩

右為散分為六分每服水一鍾煎六分去滓不計時

溫服

阿膠丸 治產後痢下膿血腹痛

阿膠

一兩
搗碎

黃連

一兩
去須

乾薑

半兩
炮

木香

三分

厚朴

三兩
去粗

皮薑汁炙

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九食前米飲下

治產後赤白痢久不斷身面悉腫

大豆

熬

小麥

蒲黃

各一
升

吳茱萸

右水九升煮取三升去滓分三分亦可以水五升酒

一斗煎取四升分四服此藥神驗

黃連散 治產後下痢

黃連

一兩

黃芩

蟄虫

熟地黄

各一兩

右治下痢酒服方寸匕日三服十日愈

治產後下痢不禁止因氣乏欲絕無問赤白水穀不分

黃連

厚朴

各三兩

芍藥

黃栢

各一兩

右水六升取二升分溫二服

當歸湯

治產後赤白痢臍腹撮痛

當歸

犀角屑

黃芩

去黑心各一兩

黃連

去鬚二兩

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

駐車丸 治產後冷熱痢腹痛

乾薑

二兩炒

黃連

去鬚六兩

阿膠

炒別為末

當歸

各三兩

右除阿膠外搗羅為末用多年陳醋消膠令鎔和為丸併手丸如梧桐子大每服二十九丸陳米飲下日再服甚者加丸數

地榆飲 治產後赤白痢久不止臍腹疼痛

地榆 酸石榴皮

各一兩

黃連

三兩

當歸

炒三兩

右為麤散每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

膠豉湯 治產後虛冷下痢并血液輸瀉腹痛

阿膠

一兩
搗碎

豉

一兩

薤白

七莖
切

生薑

切一兩

右為散水二大觔煎二分去滓食前分三服

厚朴湯 治產後下痢下部冷痛

厚朴

一兩半
薑汁炙

乾薑

三分

黃連

一兩去
鬚微炒

當歸

一兩
剉

右為散每服三錢水一鍾煎六分去滓溫服日三四

服

犀角散 治產後熱毒痢

犀角屑

一兩

苦參

一兩

黃連

一兩

黃栢

一兩

右為末每服粥飲下日三四服

桃膠丸 治產後下痢赤白裏急後重痠刺等症

桃膠

瓦上焙乾

沉香

蒲黃

隔紙炒等分

右為末每服二錢粥飲調下日三四服

黃連丸 療產後冷熱痢

黃連

六兩

烏梅

三兩

乾薑

一兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大空心米飲下三十九忌

食猪肉

赤散

治產後下痢

赤石脂

代赭

各三兩

桂心

一兩

右為末酒服方寸匕日三服十日愈粥飲下亦可

三聖散

治產後赤白痢不止

烏魚皮

炒

燒綿灰

血餘灰

各等分

右為細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

舒眉丸 治痢痛

五靈脂

蒲黃

炒各等分麝香少許

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一九醋湯下

牛鰓散 治產後血痢不止

黃牛角鰓

三兩半燒灰

橡實

一兩炒

側柏葉

半兩焙

右為散每服二錢米飲空心調下服

桂薑散 治產後冷痢疾

桂去粗皮阿膠炙當歸各半
薑汁炙

右為細末空心米飲調下二錢日再服

神麴散 療婦人生產多臍下冷數痢瘦不能食令人

腹發花色方

麴二升寬器中熬熟地黄五升白朮五
令香發即止

右為末每日以好酒服兩大匙無酒米飲及乳下

沒藥散 治婦人產後痢疾

沒藥一兩木香二兩阿膠一兩
搗碎

右為末每服二錢粥飲調下二錢日三四服

治產後赤白痢日夜數十行

買子木

一兩

生藕

肥長者一尺一挺搗絞取汁

盆麻絞頭

右水二小盞煎上件二味藥至一大盞去滓用藕汁相和更煎三五沸分為三服

治產後痢下膿血腹痛

臭樗根

一兩微炙

地榆

一兩半

甘草

半兩炙

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九食前粥飲下

療產後氣痢不止日夜十餘次者

青木香

三
分訶子 酥炙黃去
核八分

右為細末空心米飲調下方寸匕一方用縮砂仁三
味等分為細末入蜜一匙米飲調下二錢

療產後痢而渴飲無度數

麥門冬

十二
分烏梅 二十
箇

右細切以水一升煮取七合細呷

治產後瀉下血不止

右用艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服立止

茱萸丸 治產後赤白痢日久臍腹疼痛

吳茱萸

一兩黑豆
汁浸乾

黃連

去積一
兩半

為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎芍藥湯
下空心食前服

甘草散 治產後下痢赤白久不瘥

甘草

半生
半炙

黃連

炒各
二兩

右為散每服二錢溫漿湯調下食前服

木香散 治產後痢不止

木香

三分 訶梨勒皮 一兩半

右為散研勻每服二錢米飲調下

乳薑散 治產後冷痢疾

右以乾薑二兩炮搗羅為細末以人乳汁和作餅以慢火炙令黃熟研為細末每服空心陳米飲調下三錢

產後赤白痢葱白一握餘兩合好豉煎喫了當時除

治產後痢久不瘥

倉米

一合當歸一兩

右以水一大盞煎六分去滓分為二服

治產後下痢白多赤少腹痛不止

甘草

半兩炙

川烏頭

半兩去皮臍去

右將水一大盞煎取半盞食前分二服

產後諸痢方

右煮薤白食之

又方

右以羊腎脂炒薤白空腹食尤佳

又方

右炙肥羊肉食之

療產後血痢小便不通臍腹痛

右用生馬齒莧搗取汁三合煎一沸下蜜一合調頓服

療產後血不止

右用臭樗根六分為末水和丸如棗核大麵担作餅
飽無度煮二七箇熟吞之

療產後痢日久津液枯涸四肢浮腫口乾舌燥

右以冬瓜一枚黃泥裹厚五寸煨令爛熟去皮攪汁
服之瘥

治產後大小便血痢

右用髮灰為末米飲調一錢空心服

治產後血痢

右用生薑不拘多少切成小棋子片以麴搜毬子慢火炒令黃色為末米飲調下三錢空心服

治臨產而痢

右用梔子燒灰空心調下一匙大甚者不過五服

治產後痢無不效

右用蒼耳子葉為汁溫服半盞日三四服

治產後瀉痢

右用龍牙草根焙乾不拘分兩搗為細末用米飲調

服一錢

治產後痢

右用沒石子一箇燒為末和酒服方寸匕冷即酒服
熱即飲下

治產後虛及痢

右用鷄子醋煮服之一方用黃脚鷄子一枚水攪取
兩服合水服之

治產後下痢腰腹痛

右用野鷄一隻作餽飩食之

治產後痢

右用鯢魚骨尾其尾長二尺燒為黑灰為末酒下先服生地黃汁蜜煎訖然後服之無不斷也

春蕨散 治產後痢疾

右用新生蕨菜不拘多少陰乾為細散每日空心陳米飲調下三錢

芸薹散 治產後下痢久不止

右用芸薹不拘多少淨洗爛煮飽食住一方用子二兩微炒為末每服一錢粥飲調下

治產後痢無不瘥

用劉寄奴一兩為末每服二錢陳米飲調下

產後積多因食葷太早作瀉謂之新產痢腹痛不止有死無生惟神仙感應丸救之庶活萬一

治產後產前痢

右用龜一枚米醋搗為末米飲調下

硃砂丸

治一切積滯化氣消食補益真氣產後逐

敗血補虛至善

硃砂

揀通無石者
別研如粉

天雄

用無灰酒煮五七
百沸候軟去皮

金鈴子

去皮

當歸

各淨
二兩

巴戟

檳榔

木香

舶上茴香

炒

附子

炮

沉香

阿魏

半兩米醋磨
成膏入諸藥

肉從蓉

一兩

右為細末以無灰酒煮白麵糊丸如梧桐子大每服
三十丸空心日午溫酒下

此方家家有之吾家婦人常病下痢日久甚困篤百

方不瘥服此乃愈

士人李潛善醫曰痔中痢與他痢不同常痢可用苦
澁藥止之痔中主於投虛不足澁之則血愈不行痢
當更甚

陰脫 附論

夫婦人臨產努力太過致陰下如脫肛狀及逼迫腫痛
舉動房勞能發作清水續續小便淋露

方

玉龍湯 治婦人產後用力太過產門突出

右以四物湯入龍骨真者為末少許煎空心連進二服麻油湯熏洗

療陰下脫出

皂莢

去皮子

半夏

洗

大黃

細辛

各四分

蛇床子

六分

右搗散薄絹袋盛如指大內陰日二易又以羊脂已煎遍塗止以鐵精傅脂上多少令調以火炙布令煖以熨之研磁石酒服方寸匕日三服

當歸散 治陰下脫

當歸

黃芩

各一兩

芍藥

半兩

牡蠣

一兩二錢半

蛻皮

燒存

性二錢半

右為末每服二錢溫酒或米飲調下忌作勞舉重

治產後陰脫 此趣產勞力而致陰下挺出腫痛

五倍子 蛇床子 荊芥 枳殼

右味煎湯洗之

硫黃湯 治產勞玉門不開

硫黃 吳茱萸 兔絲子 蛇床子

各一兩半

右為散每服四大錢水一碗煎數沸去滓洗玉門日

再洗

治子宮不收

荊芥穗 藿香葉 臭椿樹皮

各等分

右將前藥煎湯熏子宮即入

療婦人陰下挺出

蜀椒 烏頭 白芨

各二分

右搗篩以方寸用綿裏內陰中入三寸腹中熟明旦更著瘥止一方無蜀椒

治婦人產後陰下脫

蜀椒升一吳茱萸升二戎鹽半雞子大

右三味搗以綿裏如雞子大內陰中日一易二十日愈

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊骨各半五味子一分千金翼用三銖一方無之

右為細末研令極細糝患處日三易

治子宮脫出

蕁麻葉

有九角
葉者好

飛過白礬

各等分

右為細末以紙片攤藥末於紙上托紙藥於脫處用手徐托脫肛門處便入

治婦人子宮出痛不可忍

右用五倍子白礬為末溫湯泡洗又先用淡竹葉根煎湯洗後仍用此末藥糝立效

治婦人陰挺下脫

蛇床子

五兩 烏梅 十四

右剉碎水五升煮取三升去滓熱洗日五次
療產後陰下脫方

鰲頭

二箇
陰乾 葛根 一斤

右為末酒服方寸匕日三服

陰脫洗熨方 治產後陰門開而不閉

蛇床子

炒 五倍子 各等分

右煎湯乘熱以舊衣帛蘸藥洗

治婦人產後子宮脫出

用酸豚草俗名老鴉酸煎湯用草坐不開孔纔熏收
一半稍溫下手洗並收入而安

治婦人子宮出不可忍

用草麻子塗頂心吸如入即洗去藥亦妙

治婦人瘰疾

用溫水先洗軟却用飛鼠糞燒烟熏之

又方

用黃栢一兩為末浸冷水洗

治產後陰腫下脫腸出玉門不閉

用石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一

斗二升緩緩洗一方可燒草以水二斗投灰中坐須臾

療產後陰下脫

用兔頭燒作末傅之瘥

治產後陰脫

用車釭頭脂燒作灰內酒中分溫三服

治產後陰脫下

用慎火草一斤陰乾以酒五升煮取汁分溫四服

治產後陰下脫療陰腫

以鐵精粉推內之

又灸臍下攢
文二七壯

治產後陰下脫

用人尿炒令赤以酒服方寸匕日三服

治婦人產後陰下脫

取蛇床子一升布裏炙熨之亦療中痛

治陰脫

以鐵精羊脂二味攪令稠布裏炙熱熨推內之瘥

治產後陰痛

以訶梨勒和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

不語 附論

夫產後不語何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌

心氣閉塞則舌亦強矣故令不語也

方

七寶飲 治產後不語敗血閉於心竅神志不能守舍
又心氣閉則舌強不語

川芎 人參 石菖蒲 生地黃

各一兩

細辛

一錢防

風

半錢硃砂

半錢別研

右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時地黃膩膈
以當歸代之効尤甚

孤鳳散 治產後閉目不語

用白礬細研每服一錢以熱水調下

乍見鬼神

附論

夫產後乍見鬼神者何答曰心為一身之主因產後耗傷
血脉心氣虛則敗停積上干於心心不受觸遂致心中
煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼風邪
如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一撮得
睡即安

方

小調經散

方見本門浮腫類本方無龍腦

八寶散

一名七寶散

治產後乍見鬼神

方見本門不語類

甘草小麥大棗湯

治婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神

靈作數欠伸

甘草

三兩小麥一升大棗十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

調經散

產後血虛心無所主躁不安乍見鬼神言語

顛錯

麝香

琥珀

並細研

桂心

各一兩

芍藥

當歸

各一分

乳

香

研

細辛

各半兩

右為末每半錢薑汁同溫酒調下

諸疾方

大聖散

治婦人血海虛冷久無子因產後敗血衝心

中風口噤子死腹中擘口灌之須臾生下墮胎攻刺

腹痛橫生逆生胎衣不下血運血崩血癖血入四肢

應血臟有患及諸風氣傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍
身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白二帶下乳生惡氣
胎宮虛冷曾墮胎崩中不足因此成疾及室女月水
不通常服煖子宮和血脉悅顏色退風冷治百病無
治男子五勞七傷虛損等病

澤蘭葉

石膏

各一兩

桔梗

厚朴

薑炙

吳茱萸

湯洗七次炒

白茯苓

卷栢

去枝

北細辛

去葉

栢子仁

防風

各一兩

人參

三兩

川芎

一分二兩

藁本

川烏

炮去皮臍

乾薑

黃耆

五味子 白芷 丹參 川椒 去子閉目者炒出汗 白朮 各三

兩 當歸 芍藥 甘草 炙 蕪荑仁 各一兩二分 阿膠 炒

生地黃 白微 各半兩 肉桂 去皮一兩

右為末每服二錢空心熱酒調下急卒有患不拘時服產後不問下血多少須日進黑神散二服下血少者以大聖散間之至一服腹中無痛處方服四物建中湯之類若早服則補住敗血為後患不淺黑神大聖散非逐血藥但能推陳致新多飲不妨

勝金丸 治血暈血氣及滯血不散便成癥瘕無瀉面

色黃腫嘔吐惡心頭目眩暈口吐清水四肢羸弱五
臟虛怯常日睡多喫少久為勞疾如此所患宜服之

澤蘭葉

四兩

芍藥

蕪荑仁

甘草

當歸

芎藭

各六分

乾薑

桂心

各三分

石膏

桔梗

細辛

厚

朴 吳茱萸

栢子仁

防風

烏頭

炮

白微

枳殼 南椒

石灰

蒲黃

石斛

茯苓

各三分

白朮

白芷

人參

青木香

藁本

各一分

右揀擇上等州土如法脩製為末煉蜜丸如彈子大
有所患熱酒研一九入口便愈忌生冷熱物若胎死
不下胎衣在腹中並炒鹽酒服未效再服

牡蒙丸 治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風
寒氣或產後未滿百日胞絡血未盡便利久懸圉上
及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如
鷄子大者如拳按之跳手隱隱然或如蠱齧或如針
刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通

流或守胃管痛連自出子門不正令人無子腰膝疼
痛四肢沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小
便淋瀝或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁

乾薑 蠶虫 牡丹 牡蒙 厚朴 消石 前

胡 蜀椒 黃芩 桔梗 茯苓 細辛 葶藶

人參 芍藥 吳茱萸 桂心 各二十
八銖 大黃 二兩
半

附子 一兩
六銖 當歸 半
兩

右為末蜜和更萬杵丸如梧桐子大空心酒服三九

日三不知則加之至五六丸下赤白青黃物如魚子者病根出矣

增損澤蘭丸 治產後百病理血氣補虛勞

澤蘭 甘草 當歸 芎藭 各四十
二銖 附子 乾薑

白朮 白芷 桂心 細辛 各一
兩 防風 人參

牛膝 各三
十銖 栢子仁 乾地黄 石斛 各三十
六銖 藁本

厚朴 蕪荑 各半
兩 麥門冬 二
兩

右為末蜜和丸如梧桐子大空腹酒服十五丸至二

十九

羊肉杜仲湯 治產後腰痛咳嗽

羊肉 杜仲 紫苑 當歸 桂心 白朮

各三兩

五味子 細辛 款冬花 人參 厚朴 芍藥

附子 萆薢 甘草 黃耆

各二兩

生薑 大棗

各八分 十三枚

枚

右咬咀以二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥煎取三升半去滓分五服日三夜二

應病散 治婦人胎前產後百病諸般崩漏

人參

白茯苓

去皮

白朮

麴炒

白微

去蘆根

當歸

各半

白

芷

半兩

甘草

三分

京芍藥

半兩

元胡索

五錢

桂

不見火

赤石

脂

火煨

牡丹

藁本

各半

沒藥

三分

沉香

三錢

錢

右為細末每服二錢入煉蜜大半匙熱酒調服如骨

蒸熟入童子小便一盞煎服不能飲酒不用小便薑

自然汁調服產後熱亦用酒蜜服有胎或產後皆可

服也

當歸丸

治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹拘

急痛引腰背面白脫色嗜臥不眠唇口乾燥心忪煩
倦手足寒熱頭重目眩不思飲食或勞傷衝任內積
風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼及
治男子婦人從高墜下內有瘀血下血等病一名大
効內補丸

真蒲黃

炒三分半

熟地黃

十兩

阿膠

當歸

續斷

乾

薑 甘草

芎藭

各四兩

附子

炮去皮臍

白朮

白芷

吳茱萸

湯洗七次
各三兩

肉桂

白芍藥

各二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食前以溫酒下漸加五十九一方加杜仲鹿茸肉蓯蓉北五味子

神授散 治婦人產後一切疾病不問大小以致危篤不能治者

牡丹皮

白芍藥

桂心

陳皮

青皮

各半兩當

歸 百合

水浸

川芎

甘草

乾薑

炮各一兩

人參

神

麴 麥蘖

炒各三錢紅花一錢半

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空

心服孕婦忌服

當歸人參散 治產後虛損痿弱難以運動疼痛不思

飲食

當歸 白朮 黃芩 芍藥 大黃 茯苓 陳

皮各五錢 人參 黃耆 厚朴薑汁炙 川芎 官桂各三

錢甘草一兩枳殼各二錢半

右為末每服三錢水一盞半薑三片煎六分去滓不
拘時溫服如大小便閉以此散下和中丸

神仙索金丹 治婦人產後血暈血虛血積不散寒熱
往來胃膈不寬氣喘不進飲食骨節疼痛生新血逐
敗血止肚痛

金滕 川牛膝 當歸 川芎 麻黃 元胡索

官桂 神麴 荊芥 粉草 赤芍藥 熟地黃

雄黑豆 各二兩

右為末溫酒調或當歸童子小便任下

治產勞方

人參 當歸 陳皮 半夏 烏梅 甘草 麻

黃根 乾薑 蓮肉 胡桃 杏仁 小麥

各一錢半

青色鵝

一箇

右咬咀乘在鵝鵠肚內用水二碗煎八分酒一大盞
再煎八分溫服將鵝鵠肉喫再將鵝骨并藥粗再煎
連飲二服却將骨藥晒乾研為末煉蜜為丸如梧桐

子大或酒入鹽湯空心服三十九無不應驗功效非常

黑散子 治產後一切疾神効

鯉魚皮

三兩
燒灰

芍藥

蒲黃

各二兩

沒藥

桂心

好

墨 卷栢

青木香

麝香

各一兩

男髮灰

錙墨

各半兩
當歸

右為末以新瓷器盛密封勿令走氣每產後以好酒調下一錢如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼痛不

可忍塊血癥血疾甚日加兩服不拘時候忌冷物果

子粘食

吳茱萸湯 治產後虛勞百症悉皆治之

吳茱萸

一兩半
泡七次

桔梗

福薑

炮

甘草

炙

麥門冬

去心

半夏

泡七次

防風

真細辛

白茯苓

牡丹皮

桂心

當歸

酒炒各
半兩

右咬咀每服三錢水三盞半煎七分頓服

溫經湯 治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹唇

口乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時
泄痢經脉不調久不懷孕衝任虛損月候不勻或崩
中去血過多不止

吳茱萸

三兩

白芍藥

當歸

芎藭

各三兩

麥門冬

半夏

各三兩半

人參

阿膠

牡丹皮

去心

甘草

桂心

各一兩

兩

右為末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓空心
食前服忌生冷羊肉發物等

黑龍丹 治產後難生或胎衣不下產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疼痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神身熱頭痛或類瘧疾胎前產後一切危急垂死黑龍丹灌三四丸救活一切血疾垂死惡證妙不可言

當歸

去蘆

川芎

大者

地黃

生乾

五靈脂

去石

良薑

各一兩

淨用菜豆炒

合

硫黃

各錢半

花藥石

琥珀

真的各一錢

百草霜

五兩

別研

右兩項末煮醋糊為丸彈子大每服一丸燒通赤以生

姜自然汁與無灰酒各一合童子小便半盞攪和投藥於中研化頓服應有危證灌此入口無不作効○產後一切血疾淋露不快兒枕不散積癥堅聚按之櫻手寒痛攻心垂死但灌藥下咽立効和劑方名琉珀黑龍丹唇青沫出子母皆致不救若兩臉微紅母却得生詳審用之姓娠得病用附子等劑醫家惟恐墮胎且如服他藥不効日月因循養成大病子母皆殂是愛指失掌豈不先救母斯若有實對証用藥治

療終不致於俱殞也昔有朱汴水部施黑龍丹九產後諸病危死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行効應如神果不可盡述

黑琥珀散 治產後一切疾病產前胎死產橫生逆生產後衣不下衣帶先斷遍身疼痛口乾心悶非時不語如血暈眼花言語為暗乍寒乍熱誤以為瘧疾四肢浮腫誤以為水氣言語顛狂乍見鬼神誤以為邪

崇腹脇脹滿嘔逆不定誤以為翻胃大便秘澀小便
出血誤為五淋及惡露未盡經候未還起居飲食便
不戒忌血氣之疾即聚成塊散即上衝氣急心痛咳
嗽睡多驚悸盜汗崩敗中癥遶臍刺痛或即面赤因變
骨蒸皆宜多服此藥若產後鼻衄口黑色氣短喉中喘
中風口噤皆為難治須急服之凡未產前宜一兩服能
安神順胎產後雖無疾七日內亦進一二服能散諸
病或因驚恐變生他証當連服取効

琥珀

研別製

硃砂

研別

百草霜

研別

新羅白附子

炮

松墨

燒

黑衣

皂屋塵是也

血猫灰

鯉魚鱗是也燒為末各半兩

麝香

研

當歸

去蘆

白蚕

即殭蚕是也各一分

為散每服二錢炒姜溫酒和童子小便調下食前一

方有桂心半兩無小便

大黑神散 治婦人產後衆疾並皆治之

生熟地黄

生者半兩熟一兩

甘草

炙一兩

當歸

酒浸半日燥稱

肉桂

各三兩一分

乾薑

炮一兩一分

白芍藥

真蒲黃

紙裹炮各一兩

極

小黑豆

炒去皮一兩半
一方作黑豆

附子

炮六錢去皮
臍重二錢

右為末每服二錢產後一旬內並以童子小便溫調服○胎斃腹中溫酒下○月內不語加獨活末酒調下衣帶斷胞衣不下血暈口乾心悶乍寒乍熱四肢浮腫凡有此症並宜服之○惡露不盡血氣刺痛入炒三稜加延胡索各半錢酒調下○小便不通或出血加琥珀末半錢米湯調下大便秘加大麻仁半錢煎枳殼湯下水瀉加乾薑末陳米飲下惡痢濃瞿麥

湯下中風手足痲痛加荊芥末煎湯下遍身疼痛加黃
耆末酒下血崩濃煎艾湯下咳嗽微汗加人參白朮
末薑湯下血渴加蒲黃乾葛湯下米飲亦可嘔逆惡
心煎人參陳皮湯鼻衄煎茅根湯下○鼻衄非常口
鼻黑色汗如雨氣急喘嗽皆不治○局方黑神散於
本方去附子生地黃七味各一兩黑豆炒去皮二兩
為末溫酒半盞童子小便半盞同煎五分調二錢連
進二服無時服○產寶云胎死不下產母舌青者去

蒲黃加熱附子半兩若心腹刺痛加元胡索末半錢
溫酒調下鮑氏方內血暈荊芥燒灰存性同藥調下

詹療方云昔有永嘉法曹司馬述妻分曉亟賸黑神
散三貼與服惡血稍多進第二服其血如傾扶策登
床耳間如鼓聲者數百二三婢重手按其頭稍定急
服當歸鹿茸二物湯夜以繼日而鼓聲漸遠半月平
復則知黑神散亦未猛進也此盧祖常易簡糾繆中
載然謂遇產後自不可以易用藥況市黑神散安可
不辨其精粗真偽耶
本方加川芎一兩

烏金散 治產後血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛

頭目昏眩無力汗多又治崩中下血過多不止並宜

服之

麒麟竭

百草霜

亂髮

要男者燒

好松墨

煨醋

延胡

索

鯉魚鱗

燒為末

當歸

肉桂

赤芍藥

各等分

右為末每服二錢溫酒調下

蒲黃湯

治產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼血未除腹

中脹滿欲死方

蒲黃 生地黃

生薑

各五兩

芎藭

桂心

各一兩

芒

硝

二兩 桃仁

二十枚 大棗

十五枚

右呖咀以水九升煮取二升去滓內芒硝分三服日
三良驗

烏金散 治產後十八疾方論方與局方黑神散同有
人選集調十八首言語鄙俚故不錄

一曰產後因熱病胎死腹何但服烏金散○二曰
產後者何但服烏金散○三曰產後胞衣不下者
何但服烏金散○四曰產後血暈者何但服烏金
散○五曰產後口乾心悶者何但服烏金散○六

曰產後乍寒乍熱者何但服烏金散○七曰產後
虛腫者何但服烏金散無服硃砂丸○八曰乍見
鬼神者何但服烏金散○九曰產後月內不語者
何但服烏金散○十曰產後腹內疼痛無瀉者何
但服烏金散無用止瀉調氣藥○十一曰產後遍
身疼痛者何但服烏金散○十二曰產後血崩者
何但服烏金散○十三曰產後血氣不通咳嗽者
何但服烏金散○十四曰產後乍寒乍熱心痛月

候不來者何但服烏金散○十五曰產後腹脹滿
嘔逆不定者何宜服烏金散次服硃砂丸三二日
炒生薑散湯下七丸○十六曰產後口鼻黑氣鼻
衄者何論同此症不可治○十七曰產後喉中氣
喘急者何論同十死不治○十八曰產後喉中氣
喘急者何但服烏金散○已上與郭稽中二十一
論答同故不詳錄

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛

大便澁滯悉能治之涼膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草 各半 苦根 炒 川芎 白芷

各一兩 當歸 一分 芍藥 三分

右為細末每服二平錢水一盞煎七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

半夏茯苓湯 治產前胸中宿有痰飲產後多致眩暈

半夏 湯洗 白茯苓 去皮 陳皮 去白 白朮 各一兩 丁香 縮砂

各五錢 粉草 三錢

右判散每服四錢生薑三片烏梅一个煎溫服

療產後腹痛氣脹脇下妨滿不能食無之微痢

茯苓

人參

厚朴

各八分

甘草

炙

陳皮

當歸

黃芩

各六分

右搗散以飲下方寸日三度漸加至一錢半

當歸飲子

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏

重心忪煩赤口燥咽乾發渴盜汗減食嗜臥及血熱
相搏月水不調臍腹脹滿痛寒熱如瘧又療室女血

弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

當歸

柴胡

各二兩

人參

一兩

半夏

七錢半

白芍藥

一兩半

黃芩

一兩

甘草

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎八分去滓不拘時服

紅花散 治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血皆治之

紅花

乾荷葉

牡丹皮

當歸

蒲黃

炒各等分

右為末每服半兩酒煎和滓溫服又如衣不下別末
榆白皮煎湯調下半兩

五通散 補婦人產後諸虛血氣不調臍腹疼痛痞滿
塊滯瀉痢一切諸虛

五靈脂 乾薑 良薑 青皮 陳皮

各兩

右為末每服三錢水一盞半煎七分去滓食前溫服
日二服

四味湯 產後一切諸疾纔分娩吃一服尤妙

當歸

心膈加錢半

元胡索

氣悶急加半錢

血竭

惡露不快加半錢

沒藥

心腹刺痛加半錢

右等為細末每服各炒半錢用童子小便一盞煎六

分口服

地黃煎 治產後諸疾

生地黃汁

生薑汁

各一升

藕汁

半升

大麻仁

三兩去核殼為

末

右和停銀器內慢火熬成膏溫酒調下半匙更以北

木煎膏半盞入之尤佳產寶方無麻仁用白蜜治產後虛憊盜汗嘔吐

地黃丸 治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語胃脹滿水穀不化口乾渴及療咽喉腫痛中心忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩如豚肝狀臍腹疼痛四肢腫滿唇口指甲青黑○一方地黃減半當歸一兩延胡索琥珀各一兩名琥珀地黃丸

生地黃

研取汁

生薑

各二斤
研取汁

蒲黃

當歸

各四兩

右於銀石器內用慢火取地黃汁炒生薑渣以薑汁炒地黃滓各令乾四味同焙乾為細末醋煮麵糊丸如彈子大每服一九食前用當歸酒調下

羊肉湯 治產後腹中疼痛虛勞不足裏急脇痛並治寒疝

當歸

三錢

生薑

一分

精羊肉

四兩

陳皮

半兩

右剉散水三碗酒少許煎至一碗去滓分二服或少

加葱鹽亦佳

四物湯 治產後榮衛大虛血氣未定或內積虛損外

傷或飲食甘辛所致及口乾痞滿當審所因治之用

四物湯去地黃加人參烏梅煎外傷燥熱者屬何經

以為治療方

見本門
虛渴類

地黃酒 治產後百病未產前當預釀之產訖葶中服
之

地黃汁 升一好麴

好米

各二升

右先以地黃汁漬麴令發準家法醞之至熟封七日
取清服之佳

黑神散 治產後諸疾如產臥畢切須用童子小便調
服數沸除百病如無小使用白湯亦可

三合湯 治喉痛風毒積於臟腑毒氣隨經流轉虛行
而實止在身而為腫毒在咽喉為痛妊娠者最宜急
治否則子母俱傷產前產後妊娠同三合湯治之

升麻

桔梗

甘草

各半
兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後服之

大豆紫湯

治產後百病及中風舌強口噤煩渴頭眩

目直視皆因虛風濕及勞傷產後及諸風病不得用藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉筋吐痢

必死無疑大豆紫湯產後大善

方見本門中風類

芎藭湯

一名芎調散

治大產小產對症加添服餌一名二

奇散治產後頭疼懸虛心煩眩暈目暗耳聾滿塞舉頭欲倒死胎血暈悶昏不醒人事或胎傷或金瘡或

崩中或諸般去血不止者並皆治之

芎藭

當歸

去蘆酒浸
各等分

右咬咀每服三錢以水一盞半煎七分去滓溫服不
拘時候○如腹中刺痛加芍藥煎○口乾煩渴加烏
梅煎○發寒熱加甘葛芍藥煎水停心下嘔逆加茯苓
生薑煎虛煩不得眠加人參竹葉煎○大便秘澀
加大黃煎○小便不利加車前木通煎○腹脇膨脹
加厚朴煎○血崩不止加香附子煎○咳嗽痰多加

紫苑半夏生薑煎○腰痛脚疼加牛膝煎○心下疼痛加延胡索○惡血不下加牡丹皮煎○產後疼痛不可忍加官桂童子小便煎服之立効

治虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯起衝心腹內攪疼及經絡不通男女中風口噤不語宜此法

用乳香細研末方寸酒煎蘇木去滓調立吐惡物
瘥

律草汁 治產後婦大喜汗出汚衣赤色及膏淋尿血

用葦草不拘多少搗取汁二升醋二合和空腹一盃
或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

治產後肌羸

用乳柑子樹皮為末酒下

治產後遍身如粟米熱如火者

用桃仁研臈月豬脂調敷上日易

桃仁煎 治婦人產後百疾諸氣補益悅澤

右用桃仁一千二百枚搗令細熟以上好酒一斗五

升研濾三四遍如麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶
中蜜塞以麪封之內湯中煮一沸時不停亦勿令火
猛使瓶口常出在湯上無令沉沒熟訖溫酒服一合
日再雖丈夫可服之

備急丹 治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊等疾
用錦紋大黃一兩杵為細末釀醋半升同熬成膏丸
如梧桐子用醋七分盞化五丸服之須臾血下即愈
亦治墜馬內損惡血不下 此藥難用大段虛弱不

可服其調藥醋不宜大酸便損肺臟全在醫者斟酌
麻根散 治產婦諸症

用苧麻根或麻笋如產後惡血不散衝心刺痛以前
藥打爛貼腹上服巾包之如無麻根以麻笋同苧麻
作枕頭睡苧麻根包在腹上立愈如孕婦或子死不
死胎動每用水酒煎連煎數服胎若已死即下未死
其胎即安○又治產前產後未產發寒熱者加生薑
三片酒水同煎服之又治室女心腹刺痛經脉不調

用酒煎服又治胎氣不安以酒煎服亦治子死腹中如大黑豆一勺炒熟水酒同煎服之

瓜子湯 治產後腸頭如似針刺連轂道又如痔痛小便如淋狀或寒熱此由產時用力氣併腸間亦由陰虛陽邪中之毒氣攻衝恐成腸癰

瓜蒌子

桃仁

去皮尖

牡丹皮

各一兩

薏苡仁

四兩

右為散每服五錢水二盞煎至一盞服

後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脉之海

起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣覃滿及變鼻衄此緣產後虛熱變生此症世有患者名胃絕肺壞此症不可治故不出方也遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條繫繫中指節上即止無藥可療亦厭禳之一端也

若胎已落而母死者

用磨石上蓋以杵產婦腹三五迴即活

治產後風虛五緩六急手足頑痺頭眩血氣不調
用大豆一升炒令熟熱投三升酒中密封隨性飲之
墜氣丸 治婦人產後血塊積滯腹痛惡穢不下一切
諸疾瀉痢等

巴豆

四十九箇
去皮生研

寒食麵

三錢蒲炒
用半錢

黃丹

三錢蒲炒
半錢

右研勻滴水為丸如豆大每服三四丸水二盞入秤
槌穀查七個同煮放冷送下虛實加減取微利



普濟方卷三百五十五